arXiv:math/0501320v2 [math.AG] 24 Jan 2005

Sur la dimension de l'ensemble des points base du fibré déterminant sur $\mathcal{SU}_C(r)$

SCHNEIDER Olivier *

Résumé

1 Introduction

Soit C une courbe lisse de genre $g \geq 2$ sur $\mathbb{C}$. Soit $\mathcal{J}$ la Jacobienne de C. Soit N un fibré ample sur $\mathcal{J}$. Dans [**R**], M.Raynaud construit à partir de N, un fibré F_N sur $\mathcal{J}$ dont la restriction à C, notée E_N, est un fibré semi-stable. On étudiera dans un premier temps quelques propriétés de F_N pour en déduire notament la stabilité de E_N.
Soit $\mathcal{SU}_C(r)$ l'espace des modules des fibrés vectoriels semi-stables sur C, de rang r et de déterminant trivial. On rappelle qu'un fibré E de $\mathcal{SU}_C(r)$ est un point base du fibré déterminant si pour tout fibré en droites L de degré $g-1$, $H^0(C, E \otimes L) \neq 0$ (voir [**Be2**]).
Soit $\mathcal{U}_C(r, \mu)$ l'espace des modules des fibrés vectoriels semi-stables sur C, de rang r et de pente μ. Pour tout $\mu \in \mathbb{Z}$, $\mathcal{U}_C(r, \mu)$ est, à un recouvrement étale fini près, le produit de $\mathcal{SU}_C(r)$ par $\mathcal{J}$. De ce fait, on détermine ici des points bases du fibré déterminant en construisant des fibrés E de $\mathcal{U}_C(r, g-1)$ tels que pour tout fibré en droites L de degré 0,

$$h^0(C, E \otimes L) \geq 1. \qquad (R)$$

Pour cela, on étudie le cas $N = \mathcal{O}_{\mathcal{J}}(n\Theta)$, $n \geq 2$, avec Θ un diviseur de la polarisation principale sur $\mathcal{J}$. On notera dans ce cas F_n et E_n les fibrés associés respectivement sur $\mathcal{J}$ et C. Le choix de N n'étant pas canonique, les propriétés démontrées par la suite sur ce fibré seront les vérifiées par tout autre fibré $E_n \otimes L$, où L est un fibré en droites de degré 0 sur C. On dira que ces fibrés sont de "type E_n". On démontre ici dans la deuxième partie le résultat suivant :

Proposition 1.1 *Soit $n \geq 2$ et $k \geq 1$. Le sous-espace W de $\mathcal{U}_C(kn^g, g-1)$ des fibrés stables contenant un fibré de type E_n est de codimension $kgn^{2g-1} + 1 - g$.*

*Laboratoire J.-A. Dieudonné U.M.R. no 6621 du C.N.R.S. Université de Nice - Sophia Antipolis Parc Valrose 06108 Nice Cedex 02 France. email : oschneid@math.unice.fr

Dans [**R**], Raynaud démontre que E_n est un fibré stable de rang n^g, de pente g/n, tel que pour tout fibré L de degré 0,

$$h^0(C, E_n \otimes L) \geq 1.$$

De ce fait, pour tout $r \geq n^g$, tous les fibrés de $\mathcal{U}_C(r, g-1)$ contenant des fibrés de type E_n ne vérifient pas (R) dès que $n \geq 2$. Le résultat de la Proposition 1.1 nous donne alors pour $r = kng$, avec k un entier supérieur ou égal à 1, une minoration de la codimension du lieu de base du diviseur thêta de l'ordre de $\frac{1}{kn}\dim(\mathcal{SU}_C(r))$.

2 Propriétés du fibré F_N.

Soit C une courbe lisse de genre $g \geq 2$ sur $\mathbb{C}$. Soit $\mathcal{J}$ la Jacobienne de C. On identifie canoniquement $\mathcal{J}$ à sa variété abélienne duale grâce à la polarisation principale sur $\mathcal{J}$. On note $\mathcal{P}$ le fibré de Poincaré sur $\mathcal{J} \times \mathcal{J}$, trivial sur $\mathcal{J} \times \{0\}$ et sur $\{0\} \times \mathcal{J}$. Soient p_1 et $p_2 : \mathcal{J} \times \mathcal{J} \longrightarrow \mathcal{J}$ les deux projections. Soit $D(\mathcal{J})$ la catégorie dérivée associée aux faisceaux cohérents sur $\mathcal{J}$ et $[g]$ la translation de g degrés vers la gauche dans $D(\mathcal{J})$. Dans [**Mu**], Mukai définit la transformée de Fourier-Mukai comme l'application

$$\begin{array}{rccc} \mathcal{F}: & D(\mathcal{J}) & \longrightarrow & D(\mathcal{J}) \\ & M & \longmapsto & Rp_{2,*}\left(p_1^* M \otimes \mathcal{P}\right). \end{array}$$

Soit N un faisceau ample sur $\mathcal{J}$, on note

$$F_N := \mathcal{F}(N^{-1})\,[g]\,,$$

ou F_D si $N = \mathcal{O}_{\mathcal{J}}(D)$. Soit $\Phi_N : \mathcal{J} \longrightarrow \mathcal{J}$ l'isogénie qui à $x \in \mathcal{J}$ associe $T_x^* N \otimes N^{-1}$, où T_x est la translation par x dans $\mathcal{J}$. On note $H(N)$ le noyau de Φ_N. Soit $l := h^0(\mathcal{J}, N)$, $H(N)$ est un sous groupe de $\mathcal{J}$ d'ordre l^2. On peut définir sur $H(N)$ une forme bilinéaire non dégénérée à valeurs dans $\mathbb{C}^*$ (voir [**M**]). Il existe alors deux sous groupes d'ordre l K et K', totalement isotropes pour cette forme et tels que $H(N) = K \otimes K'$. Soit $\mathcal{J}' := \mathcal{J}/K'$, c'est une variété abélienne principalement polarisée dont on note L' le fibré en droites associé à une polarisation principale. On a une factorisation canonique (voir [**M**])

$$\begin{array}{ccc} & \mathcal{J}' & \\ \nearrow & & \searrow{\scriptstyle \tau} \\ \mathcal{J} & \xrightarrow{\phi_N} & \mathcal{J} \end{array}$$

et le résultat suivant :

Proposition 2.1 *1. F_N est un fibré vectoriel sur $\mathcal{J}$ de rang l.*

2. $F_N \cong \tau_* L'$

3. $\Phi_N^* F_N = N \otimes H^0(\mathcal{J}, N)^*$ *comme* $H(N)$*-fibrés.*

Démonstration : Mukai prouve les deux premiers points dans **[Mu]** (p.162). Il établit aussi l'isomorphisme suivant

$$\Phi_N^* F_N \cong N \otimes V \qquad (\dagger),$$

où V est un espace vectoriel de dimension l. On rappelle maintenant quelques résultats dus à Mumford (voir **[M]**, p.288–297) : Soit $\mathcal{G}(N)$ l'ensemble des paires (x, φ), où x est un élément de $H(N)$ et φ est un isomorphisme entre N et $T_x^* N$. $\mathcal{G}(N)$ est un groupe et on a la suite exacte suivante

$$0 \longrightarrow \mathbb{C}^* \longrightarrow \mathcal{G}(N) \longrightarrow H(N) \longrightarrow 0.$$

Mumford établit que toute représentation irreductible de $\mathcal{G}(N)$ sur laquelle $\mathbb{C}^*$ agit par homothéties, est isomorphe à $\bigoplus_r H^0(\mathcal{J}, N)$ pour un entier r. Du fait de l'isomorphisme $(\dagger)$, $V = H^0(C, \Phi^* F_N \otimes N^{-1})$ et comme $H(N)$ agit sur $H^0(\mathcal{J}, \Phi_N^* F_N)$, V est une représentation irréductible de $\mathcal{G}(N)$ sur laquelle $\mathbb{C}$ agit par multiplication par l'inverse. V^* est donc une représentation de $\mathcal{G}(N)$ sur laquelle $\mathbb{C}$ agit naturellement ; pour des raisons de dimension, V^* est isomorphe à $H^0(\mathcal{J}, N)$, d'où l'égalité de $H(N)$-fibrés :

$$\Phi_N^* F_N = N \otimes H^0(\mathcal{J}, N)^*.$$

□

Soit $E_N := F_{N|C}$.

Corollaire 2.2 *E_N est stable.*

Démonstration : Soit $C'' := \Phi^{-1} C$. Soit F un sous fibré de E_N. Alors

$$\Phi^* G = M \otimes W,$$

avec M un sous fibré de $N_{|C''}$ et W un sous-espace vectoriel de $H^0(\mathcal{J}, N)^*$. Ceci impose $\mu(F) \leq \mu(E_N)$. Suppossons maintenant que F est un sous fibré strict de E_N tel que $\mu(F) = \mu(E_N)$, alors

$$\Phi_N^* F = N_{|C''} \otimes W,$$

avec W un sous-espace vectoriel strict de $H^0(\mathcal{J}, N)^*$ stable sous l'action de $\mathcal{G}(N)$. Mais ceci est en contradiction avec le fait que $H^0(\mathcal{J}, N)^*$ est une représentation irréductible de $\mathcal{G}(N)$. □

Soit maintenant $\mathcal{O}_{\mathcal{J}}(\theta)$, le fibré associé à une polarisation principale sur $\mathcal{J}$. Pour tout x dans $\mathcal{J}$ on note $M_x := \Phi_{\mathcal{O}_{\mathcal{J}}(\theta)}(x)$.

Proposition 2.3 *1.* $\Phi_N^*(\bigoplus_{x\in H(N)} M_x) = H^0(\mathcal{J},N)\otimes H^0(\mathcal{J},N)^*\otimes\mathcal{O}_{\mathcal{J}}$ *comme* $H(N)$*-fibré.*

2. Si N *est engendré par ses sections globales, on a*

$$\bigoplus_{x\in H(N)} M_x \longrightarrow F_N \longrightarrow 0.$$

Démonstration :

1. Comme $H(N)$ est un groupe commutatif, on a la décomposition suivante (voir **[S]**) :

$$H^0(\mathcal{J},N)\otimes H^0(\mathcal{J},N)^* = \bigoplus_{\chi\in Hom(H(N),\mathbb{C}^*)} V_\chi,$$

où les V_χ sont des $\mathbb{C}$-espaces vectoriels de dimension 1 tels que :

$$\forall x\in H(N),\ \forall s\in V_\chi,\ x.s=\chi(x)s.$$

De plus, pour tout x dans $H(N)$, $\Phi_N^*(M_x)$ est un fibré trivial de rang 1 stable sous l'action de $H(N)$, donc

$$\Phi_N^*(M_x) = V_{\chi_x}\otimes\mathcal{O}_{\mathcal{J}},$$

où χ_x est donné par l'isomorphisme canonique $H(N)\tilde{\longrightarrow}Hom(H(N),\mathbb{C}^*)$. De ce fait,

$$\Phi_N^*(\bigoplus_{x\in H(N)} L_x) = H^0(\mathcal{J},N)\otimes H^0(\mathcal{J},N)^*\otimes\mathcal{O}_{\mathcal{J}}.$$

2. L'application

$$H^0(\mathcal{J},N)\otimes\mathcal{O}_{\mathcal{J}}\longrightarrow N$$

est surjective. Il en est donc de même pour

$$H^0(\mathcal{J},N)\otimes H^0(\mathcal{J},N)^*\otimes\mathcal{O}_{\mathcal{J}}\longrightarrow N\otimes H^0(\mathcal{J},N)^*.$$

D'après ce qui précède, on obtient donc

$$\bigoplus_{x\in H(N)} M_x \longrightarrow F_N \longrightarrow 0.$$

□

3 Démonstration de le Proposition 1.1

Dans tout ce qui suit, $N := \mathcal{O}_{\mathcal{J}}(n\Theta)$, où Θ est un diviseur associé à une polarisation principale. On note alors F_n et E_n les fibrés associés. On dira qu'un fibré est de "type E_n" s'il s'écrit $E_n \otimes L$, avec L un fibré en droites de degré 0 sur C. Le choix de N n'étant pas canonique, ces fibrés vérifient les mêmes propriétés que E_n. Donnons maintenant quelques résultats utiles à la démonstration de la Proposition 1.1.

Proposition 3.1 *(A.Beauville) Soit C une courbe lisse de genre $g \geq 2$ sur $\mathbb{C}$ et C' une autre courbe lisse sur $\mathbb{C}$. Soit $\pi : C' \longrightarrow C$ un revêtement galoisien de groupe de Galois G. Pour M un fibré vectoriel stable sur C', on a :*

1. *$\pi_* M$ est semi-stable.*
2. *Si $\forall g \in G,\ g^* M \ncong M$, alors $\pi_* M$ est stable sur C.*

Ce résultat n'étant pas pas publié nous en donnons ici une démonstration :

Démonstration : Remarquons tout d'abord que pour tout faisceau cohérent M sur C', on a l'isomorphisme canonique suivant :

$$\pi^* \pi_* M \cong \oplus_{g \in G} g^* M.$$

Soit M un fibré vectoriel stable sur C', comme l'action de G conserve la pente et la stabilité $\pi^* \pi_* M$ est somme directe de fibrés stables de même pente.

1. Supposons que $\pi_* M$ contienne un sous fibré F de pente strictement supérieure à la pente de $\pi_* M$. $\pi^* F$ est alors un sous fibré de $\pi^* \pi_* M$ de pente strictement supérieure à la pente de $\pi^* \pi_* M$, ce qui n'est pas possible.
2. Supposons maintenant que $\forall g \in G,\ g^* M \ncong M$ et que $\pi_* M$ contienne un sous fibré non trivial F tel que $\mu(F) = \mu(\pi_* M) = \mu$. Alors $\pi^* F$ est un sous fibré de $\oplus_{g \in G} g^* M$ de pente $\deg(\pi)\mu$. Comme les fibrés $g^* M$ sont stables et non isomorphes deux à deux, $F = \oplus_{g \in G'} g^* M$, avec G' un sous ensemble de G. Cependant, comme $\pi^* F$ est $G-$ invariant cela impose $G' = G$ et $F = \pi_* M$, ce qui prouve la stabilité de $\pi_* M$.

□

Corollaire 3.2 *Soit M un fibré vectoriel sur C'. Pour M générique, $\pi_* M$ est stable.*

Démonstration : remarquons tout d'abord que pour montrer le résultat pour un fibré vectoriel générique de rang r, il suffit de le montrer pour un seul fibré vectoriel de rang r. Pour cela, on prend comme fibré l'image directe d'un fibré en droites par un morphisme étale de degré r sur C'. Cela nous amène à traiter uniquement le cas des fibrés en droites.
D'après la Proposition précédente, il faut donc prouver que pour L générique,

$$\forall g \in G,\ g^* L \ncong L.$$

Soit $g \in G$ et Z la sous variété de $\mathrm{Pic}(C^{'})$ stable par $< g >$. Soit

$$\tau : C^{'} \longrightarrow C^{'}/ < g >,$$

alors Z doit donc être contenue dans $\tau^*\mathrm{Pic}(C^{'}/ < g >)$.Mais comme par la formule de Riemann-Hurwitz, le genre de $C^{'}/ < g >$ est strictement inférieur au genre de $C^{'}$,

$$\dim(Z) \leq \dim(\tau^*\mathrm{Pic}(C^{'}/ < g >)) < g^{'} = \dim(\mathrm{Pic}(C^{'}).$$

De ce fait pour L suffisament général, L ne peut être fixé par un élément de $< g >$.
□

Lemme 3.3 *(A.Beauville) Soit C une courbe lisse de genre $g \geq 2$ sur $\mathbb{C}$. Soient L un faisceau cohérent et M un fibré vectoriel sur C tels que $h^0(C,L) \leq h^1(C,M)$. Pour c générique dans $\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_C}(L,M)$, l'application multiplication par c*

$$H^0(C,L) \longrightarrow H^1(C,M),$$

est injective.

Démonstration : Comme par dualité $H^1(C,M) \cong H^0(C,\omega_C \otimes M^*)^*$ et que $\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_C}(L,M) \cong H^0(C,\omega_C \otimes L \otimes M^*)^*$, Il revient au même de démontrer que

$$H^0(C,L) \otimes H^0(C,\omega_C \otimes M^*) \xrightarrow{\varphi} H^0(C,\omega_C \otimes L \otimes M^*) \xrightarrow{c} \mathbb{C}$$

est séparante à gauche pour c générique.
Soient A, B et V des espaces vectoriels de dimensions respectives a, b, n tels que $a \leq b$. Soit

$$\varphi : A \times B \longrightarrow V,$$

une application bilinéaire intègre et $c : V \longrightarrow \mathbb{C}$ générique. Démontrons que $c \circ \varphi$ est séparante à gauche. Pour cela, on montre qu'un hyperplan générique de V ne contient aucun des $b-$plans $\varphi(a,b)$. Ces $b-$plans sont paramétrés par une sous-variété G d'une Grassmanienne de dimension inférieure à $a-1$. Notons $\check{P}$ l'espace projectif des hyperplans de V : Soit

$$Z := \{(L,H) \in G \times \check{P} \mid L \subset H\}.$$

Z est un fibré sur G de fibre en L, l'espace projectif des hyperplans de V contenant L, de dimension $n-b-1$; de ce fait,

$$\dim Z \leq (a-1) + (n-b-1) = n - 2 - (b-a) < \dim \check{P}.$$

□

Proposition 3.4 *Soit $n \geq 2$. Soit $0 \longrightarrow E_n \xrightarrow{i} F \longrightarrow G \longrightarrow 0$ une extension générique de pente $g-1$ de E_n par un faisceau cohérent G sur C. Alors i est l'unique injection de E_n (à automorphismes de E_n près) dans F dans les deux cas suivants :*

1. *G fibré vectoriel sur C, générique*
2. *$G = \oplus_{p \in \mathcal{P}} \mathbb{C}_p$, où $\mathbb{C}_p$ est le faisceau concentré en p et $\mathcal{P}$ est un ensemble de points de C.*

Démonstration : Pour tout x dans $\mathcal{J}_n := \mathrm{Ker}(\Phi_{n\theta})$, on note $L_x := M_{x|C}$. On a dans les deux cas évoqués dans la Proposition, pour tout x dans $\mathcal{J}_n$,

$$h^1(C, G \otimes L_x^{-1}) = 0.$$

Mais comme pour tout fibré en droites L de degré 0,

$$\chi(G \otimes L) = -\chi(E_n \otimes L) > 0,$$

ceci implique

$$h^0(C, G \otimes L_x^{-1}) \leq h^1(C, E_n \otimes L_x^{-1}).$$

Par généricité de l'extension F dans $\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_C}(G, E_n) \cong H^0(C, \omega_C \otimes (E_n \otimes L_x^{-1})^* \otimes (G \otimes L_x^{-1}))^*$, on peut donc appliquer le Lemme 3.3 pour obtenir que pour tout x dans $\mathcal{J}_n$, l'application

$$H^0(C, G \otimes L_x^{-1}) \longrightarrow H^1(C, E_n \otimes L_x^{-1})$$

est injective. De ce fait, en écrivant la suite exacte longue d'homologie, on obtient que

$$H^0(C, E_n \otimes L_x^{-1}) \cong H^0(C, F \otimes L_x^{-1}).$$

En conséquence, le diagramme suivant est commutatif :

$$\begin{array}{ccc} \bigoplus_{x \in \mathcal{J}_n} \mathrm{Hom}(L_x, E_n) \otimes L_x & \xrightarrow{\psi} & E_n \\ \downarrow \wr & & \downarrow i \\ \bigoplus_{x \in \mathcal{J}_n} \mathrm{Hom}(L_x, F) \otimes L_x & \xrightarrow{\varphi} & F. \end{array}$$

Mais comme pour $n \geq 2$, $\mathcal{O}_{\mathcal{J}}(n\theta)$ est engendré par ses sections globales, on a par la Proposition 2.3,

$$\bigoplus_{x \in \mathcal{J}_n} M_x \longrightarrow F_n \longrightarrow 0.$$

De ce fait, ψ est surjective et l'image de i est égale à $\mathrm{Im}(\varphi)$. $\square$

Démonstration de la Proposition 1.1 : Considérons une suite exacte

$$0 \longrightarrow E_n \longrightarrow F \longrightarrow G \longrightarrow 0 \,,$$

pour les deux cas suivants :

1. $G = \oplus_{p\in\mathcal{P}}\mathbb{C}_p$, $\mathbb{C}_p$ étant le faisceau concentré en p et $\mathcal{P}$ un ensemble de points de C de cardinal $(g-1)n^g - gn^{g-1}$.
2. G fibré stable de degré $k(g-1)n^g - gn^{g-1}$ et de rang $(k-1)n^g$ avec $k \geq 2$.

Cela impose $\mu(F) = g-1$. Démontrons que les fibrés ainsi construits sont génériquement stables. Pour cela, on considère $\pi : C^{'} \longrightarrow C$ la restriction de $\tau : \mathcal{J}^{'} \longrightarrow \mathcal{J}$ à $C^{'} := \tau^{-1}C$ et $K := \mathrm{Ker}(\pi)$. D'après la Proposition 1, $E_n = \pi_* L^{'}$, où $L^{'}$ est la restriction à $C^{'}$ d'un fibré associé à une polarisation principale de $\mathcal{J}^{'}$. On va maintenant démontrer dans les deux cas, l'existence d'un fibré stable F, image directe par π d'une extension de $L^{'}$:

1. Si $k = 1$, considérons le fibré en droites $F^{'} := L^{'}(\sum_{p\in\mathcal{P}} p)$, où $\mathcal{P}$ est un ensemble de points de $C^{'}$ de cardinal $(g-1)n^g - gn^{g-1}$. Alors où bien pour tout $\sigma \in K$, $\sigma^* F^{'} \ncong F^{'}$ et alors $F^{'}$ vérifie les conditions de la Proposition 3.1 et de ce fait $F := \pi_* F^{'}$ est stable. Où bien il existe $\sigma \in K$ tel que $\sigma^* F^{'} \cong F^{'}$. Dans ce cas, soit $q_1 \in \mathcal{P}$, alors il existe $q_2 \in C^{'} - \mathcal{P}$ tel que pour tout $\sigma \in K$,

   $$\sigma^* L^{'}(\sum_{p\in\mathcal{P}} p) \otimes L^{'}(\sum_{p\in\mathcal{P}} p)^{-1} \ncong \mathcal{O}_{C'}(q_1 - \sigma(q_1) + \sigma(q_2) - q_2).$$

   De ce fait, pour tout $\sigma \in K$, $\sigma^* L^{'}(q_2 - q_1 + \sum_{p\in\mathcal{P}} p) \ncong L^{'}(q_2 - q_1 + \sum_{p\in\mathcal{P}} p)$ et donc par la Proposition 3.1 son image directe par π sera stable.
2. Considérons maintenant un fibré $F^{'}$ extension de $L^{'}$ par un fibré vectoriel $G^{'}$. $\det(F^{'}) = L^{'} \otimes \det(G^{'})$, donc pour $G^{'}$ générique, pour tout $\sigma \in K$, $\sigma^* \det(F^{'}) \ncong \det(F^{'})$. Cette propriété est aussi vérifiée par $F^{'}$ et par la Proposition 3.1 ceci implique que dans ce cas $\pi_* F^{'}$ est stable.

Effectuons maintenant le décompte des dimensions : par la Proposition 3.4, il suffit d'ajouter la dimension de l'espace des fibrés de type E_n, c'est à dire g, à la dimension de l'espace dans lesquel on choisit G plus $\dim(\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_C}(G, E_n)) - \dim(\mathrm{Aut}(G))$:

1. Si $G = \oplus_{p\in\mathcal{P}}\mathbb{C}_p$, $\mathbb{C}_p$, alors

   $$\dim(\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_C}(\oplus_{p\in\mathcal{P}}\mathbb{C}_p, E_n)) = \mathrm{rg}(E_n)\left((g-1)n^g - gn^{g-1}\right) = n^g\left((g-1)n^g - gn^{g-1}\right).$$

   Comme $\dim(\mathrm{Aut}(G)) = \mathrm{Card}(\mathcal{P})$ et que la dimension de l'espace dans lequel on choisit le fibré G est aussi $\mathrm{Card}(\mathcal{P})$, on a :

   $$\dim(W) = g + n^g\left((g-1)n^g - gn^{g-1}\right).$$

2. Si $k \geq 2$, $\dim(\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_C}(G, E_n)) = h^1(C, G^* \otimes E_n)$. Or pour G générique et stable de pente supérieure à la pente de E_n, on a $h^0(C, G^* \otimes E_{n\theta}) = 0$. De ce fait, on obtient par Riemann-Roch,

$$\begin{aligned} h^1(C, G^* \otimes E_n) &= \mathrm{rg}(E_n)\deg(G) - \deg(E_n)\mathrm{rg}(G) + \mathrm{rg}(E_n)\mathrm{rg}(G)(g-1) \\ &= n^g(k(g-1)n^g - gn^{g-1}) - (k-1)n^g gn^{g-1} + n^g(k-1)n^g(g-1) \\ &= ((kn^g)^2(g-1)+1) - (((k-1)n^g)^2(g-1)+1) - gkn^{2g-1}. \end{aligned}$$

et comme G est générique dans $U_s((k-1)n^g, \frac{1}{k-1}(g-1-\frac{g}{n}))$, $\dim(\mathrm{Aut}(G)) = 1$ et donc

$$\dim(W) = g + (kn^g)^2(g-1) - \left(gkn^{2g-1}\right).$$

□

Références

[A,C,G,H] E.Arbarello, M.Cornalba, P.Griffiths, J.Harris
Geometry of algebraic curves. Vol. I. Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 267. Springer-Verlag, New York, 1985.

[Be] A.Beauville
Some stable vector bundles with reductible theta divisors. Manuscripta Math. 110 (2003), 343–349.

[Be2] A.Beauville
Vector bundles on curves and generalized theta functions : recent results and open problems. Current topics in complex algebraic geometry (Berkeley, CA, 1992/93), Math. Sci. Res. Inst. Publ., 28, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1995, 17–33.

[Hi] A.Hirschowitz
Problèmes de Brill-Noether en rang supérieur. C. R. Acad. Sci. Paris Sï¿½. I Math. 307 (1988), no. 4, 153–156.

[Mu] S.Mukai
Duality between $D(X)$ and $D(\widehat{X})$ with its application to Picard sheaves Nagoya Math. J. 81 (1981), 153–175.

[M] D.Mumford
On the equations defining abelian varieties I. Invent. Math. 1 (1966), 287–354.

[P] M.Popa
On the base locus of the generalized theta divisor C. R. Acad. Sci. Paris Sï¿½. I Math. 329, no. 6 (1999), 507–512.

[R] M.Raynaud
Sections des fibrés vectoriels sur une courbe Bull. Soc. math. France, 110 (1982),103–125

[R2] M.Raynaud
Revêtements des courbes en caractéristique $p > 0$ *et ordinarité* Compositio Math. 123 (2000), no. 1, 73–88.

[S] J.-P.Serre
Représentations linéaires des groupes finis. Deuxième édition, refondue. Hermann, Paris, (1971). 182 pp.